

Rijden met medicijnen?

Je hebt medicijnen nodig en toch wil je aan het verkeer blijven deelnemen. Kan dat? Een algemeen antwoord op die vraag is lastig. Want de invloed op de rijvaardigheid hangt af van het soort medicijn, hoeveel je ervan gebruikt en hoe lang. Lees daarom altijd eerst de informatie op de verpakking en in de bijsluiter. Twijfel je, vraag dan advies aan je arts of apotheker.

Gevaar op de weg

Bij sommige medicijnen merk je duidelijk het effect. Je wordt duizelig, slaperig of gaat wazig zien. Andere medicijnen verminderen het reactievermogen zonder dat je het in de gaten hebt.



Je wordt bijvoorbeeld onverschilliger of krijgt minder controle over je spieren. In het verkeer ben je dan niet alleen een gevaar voor jezelf, maar ook voor anderen.

Is jouw medicijn rijgevaarlijk?

Op drie manieren is te zien of een medicijn gevaar kan opleveren bij deelname aan het verkeer.

- Er staat een waarschuwing op het etiket.

APOTHEEK DE CAMPAGNE

18-11-2014 DIVER V/27-04-1979
MW. V. OORLICHTING
3X DAAGS 1 TABLET
kan het reactievermogen beïnvloeden
bovendien: pas op met alcoholische drank
GEEN GRAPEFRUITSAP GEBRUIKEN


90 ST DIAZEPAM TABL 5MG

- Je ziet de bekende gele sticker op de verpakking.

**DIT GENEESMIDDEL KAN HET
REACTIEVERMAGEN VERMINDEREN.
(autorijden - bedienen van machines -
spelen op straat) Pas op met alcohol!**

- Er staat een waarschuwing in de bijsluiter.

Kom je geen van deze waarschuwingen tegen, dan mag je ervan uitgaan dat je met het medicijn veilig kunt rijden. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts of apotheker.



Je medicijn is rijgevaarlijk. Wat nu?

Stel, je krijgt een medicijn voorgeschreven waarmee je niet mag rijden. Maar je hebt de auto, motor of bromfiets toch nodig voor werk of privé. Bespreek dan met je arts of er nog andere mogelijkheden zijn.

- Misschien kan je arts een vergelijkbaar medicijn voorschrijven waarmee je wel veilig kunt rijden.
- Soms is een lagere dosering genoeg.
- Soms kan je het middel op een ander moment van de dag nemen, bijvoorbeeld vóór het slapen in plaats van 's ochtends.
- Het kan zijn dat je arts dringend adviseert niet te gaan rijden. Mogelijk geldt dat alleen voor de eerste paar weken.